



Zomersnoei: toppen en toppen

En zijn twee verschillende toppen

De eerste is de top van de boom





Voor de bloei is het precies andersom! Als je veel te veel trossen hebt zullen de getopte scheuten geen sterke uitlopers vormen en heb je naderhand te weinig uitgegroeid blad en te veel trossen! Je hebt maar weinig fantasie nodig om te beseffen welke gevolgen dat weer heeft.....

Luchtige loofwand (fig. 4)

Omdat toppen deel uitmaakt van de zomersnoei wil ik in het kort nog even de andere aspecten van deze snoei de revue laten passeren. Breek zo vroeg mogelijk (begin mei) de verkeerd geplaatste scheuten weg, dwz alle omlaag gerichte scheuten, de slechtst geplaatste scheut van iedere dubbele scheut en scheuten die zo scheef staan dat ze na verloop van

cm in de rij en 200 cm tussen de rij dan heeft de plant 2 leggers van elk 150 cm, er van uitgaande dat gesnoeid wordt met dubbel guyot en vlakboog. Er kunnen dan 7 scheuten worden aangehouden met elk 2 trossen. Stel het gemiddelde trosgegewicht op 160 gram dan kan elke plant $7 \times 2 \times 160 \text{ gram} = 2,24 \text{ kg}$ druiven per plant = gem. 1,5 liter = 2 flessen per plant. Dat is dus een halve liter per m² en 5000 liter per hectare of 6500 flessen. Voor witte wijn kun je per plant zelfs meer aanhouden.

Dit zijn opbrengsten die normaal gesproken kwaliteit zullen opleveren.

Tot slot